

Рекомендации к применению фитокомплекса приведены на основании установленных действий компонентов, входящих в его состав. Фитокомплексы VITAUCT не являются лекарственными препаратами. Перед их применением необходима консультация врача. Приведенная информация не является основанием для отказа от применения лекарственных препаратов, назначенных врачом, или отказа от обращения за медицинской помощью. Изменить схему лекарственного лечения (назначить другую дозировку препарата, заменить один препарат другим, отменить лекарственное средство и прочее) может только ваш лечащий врач!

Произведено:
ООО «Витаукт-пром», Россия.
385774, Республика Адыгея,
Майкопский р-н, ст. Абадзехская,
ул. Клубная, 59 а.

www.vitauct.ru

Заказ по тел.: 8 (800) 222-05-28.
Звонок по России бесплатный.



Информация об активных компонентах, входящих в состав фитокомплекса 9-ка ГАСТРО с алтеем

Алтей лекарственный с давних времен используется при язвенной болезни, воспалениях пищевода и гиперацидного гастрита. Благодаря наличию комплекса биологически активных веществ (слизей, флавоноидов, дубильных веществ и др.) обладает многогранным воздействием на патологический процесс при язвенной болезни желудка: обволакивающий, болеутоляющий, секретостимулирующий; регулирует продукцию защитной слизи и процессы регенерации. Защитный слой слизи (в корнях алтея до 35 % слизи) предохраняет от раздражений, ускоряет регенерацию поврежденных тканей, уменьшая воспалительный процесс, защищает слизистую желудка от повреждающего воздействия различных лекарств раздражающих слизистую желудка [1, 2].

Тмин обыкновенный способствует пищеварению, усиливает тонус и перистальтику кишечника, снижает процессы гниения и брожения, снимает спазмы, повышает секрецию желудочного сока, способствует развитию нормальной микрофлоры в кишечнике. Плоды тмина применяют при расстройствах ЖКТ (гастриты, гастродуодениты, ферментопатии, а также при колитах, энтероколитах, при метеоризме). Плоды тмина входят в состав аппетита-ного, ветрогонного, желудочного, слабительного, противорвотного сборов, а также обладают желчегонным действием и поэтому используются при заболеваниях печени, таких как острые и хронические холециститы. Кроме того растение обладает сильным глистогонным действием [3].

Цетрария исландская. В составе присутствует усиновая кислота, которая обладает сильной антибиотической активностью, антибактериальным действием по отношению к стафилококкам, стрептококкам, бактериям сублилис, микобактериям. Растение обладает мощными антибактерицидными, ранозаживляющими, иммуностимулирующими свойствами, обволакивает слизистую, оказывает успокаивающее и заживляющее действие. При язвенной болезни цетрарию принимают перед едой, что помогает предотвратить боль после приема пищи. Горечи, лишайниковые кислоты способствуют восстановлению нормального аппетита и хорошо стимулируют процесс переваривания пищи. Действие слизи цетрарии на слизистую пищеварительного тракта при желудочно-кишечных заболеваниях способствует стабилизации выделительной функции желез желудка при гиперацидном гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при поносах и прочих расстройствах в пищеварительной системе. Биологически активные вещества, в частности иридоиды — цетрарин (2-3%), а также лишайниковые кислоты обеспечивают возбуждающее действие на слизистую желудка, усиливая выделение желудочного сока. Причем действие этих веществ, хотя и медленное, но устойчивое и, самое главное, — длительное. Поэтому исландский мох способствует улучшению усвоения пищи, восстановлению сил после физических перегрузок и тяжелых заболеваний, помогает при лечении дистрофии, мышечной слабости. Лишайниковые кислоты малорастворимы в воде, но они представляют наибольшую ценность в исландском мхе. Наличие дубильных веществ (1-2%) связано с вяжущим и бактерицидным действием при воспалительных процессах слизистых оболочек, при болезнях желудочно-кишечного тракта (язвы, гастриты), а также как вяжущее средство при отравлении тяжелыми металлами и растительными ядами [4].

Мята перечная может предотвращать вздутие и расстройство желудка. Недавние исследования также показали, что экстракт мяты расслабляет органы и облегчает боли и спазмы. Отмечено, что спустя 4 недели приема перечной мяты симптомы расстройства пищеварения снижаются примерно

на 40 %. Перечную мяту можно использовать как вспомогательное средство борьбы с некоторыми бактериями, в числе которых стафилококк, сальмонелла и листерия. Мята препятствует размножению микроорганизмов, а также способна частично обеззараживать полость рта и благоприятно воздействовать на дыхание [5].

Шалфей лекарственный обладает желчегонным эффектом, помогает при вздутии живота, стимулирует аппетит и перистальтику всех отделов пищеварительного тракта; определены выраженные гепатопротективные свойства экстрактов шалфея [6].

Тысячелистник обыкновенный. Препараты тысячелистника раздражают окончания вкусовых рецепторов и усиливают секреторную деятельность желудка, расширяют желчные протоки, увеличивают желчеотделение в двенадцатиперстную кишку, повышают диурез, купируют спастические боли в кишечнике; это обуславливает их использование при сниженном аппетите, язвенной болезни желудка, язвенных спастических колитах, метеоризме [7, 8].

Расторопша пятнистая — известное лекарственное растение с гепатопротекторными свойствами. Препараты расторопши пятнистой улучшают образование и выведение желчи, секреторную и двигательную функции желудочно-кишечного тракта, повышают защитные свойства печени по отношению к инфекциям и различным отравлениям [9]. Расторопша содержит флаволигнаны, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами. Оказывает цитопротекторное действие в желудке, т. е. борется с язвами не за счет уменьшения желудочной кислоты, а за счет повышения защиты слизистой оболочки [10].

Орех черный. Антибактериальное действие фенольных соединений ореха черного было установлено в отношении 7 видов микроорганизмов, была выявлена антибактериальная активность извлечений из ядер черного ореха в отношении грамположительной бактерии Staphylococcus aureus. Антибактериальное действие препаратов ореха черного также обусловлено наличием в их составе нафтохинона юглона. Установлено, что юглон оказывает антимикробную и противогрибко-

вую активность, является натуральным антибиотиком, обладающим антипаразитарным и мягким слабительным действием. Дубильные вещества ореха ускоряют восстановление слизистых оболочек. Высокое содержание танинов в орехе позволяет успокоить слизистые покровы, сняв воспалительный процесс [11, 12].

Девясил высокий. В процессе исследований по изучению антиоксидантных свойств галеновых препаратов девясила подтверждена их терапевтическая эффективность у больных хроническим гастродуоденитом в сочетании с хроническим некаменным холециститом. Определено, что девясил высокий действует бактериостатически на Helicobacter pylori и проявляет противовоспалительное действие на слизистую оболочку желудка. Препараты девясила регулируют функции ЖКТ, нормализуют аппетит, оказывают желчегонное действие, положительно влияют на микрофлору кишечника, улучшают детоксикационную функцию печени. Препарат оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру внутренних органов (в т. ч. ЖКТ) [13].

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Алтей лекарственный. / под ред. Кароматова И. Д. Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь (47) 2021. — 339-342 с.
2. Все о лекарственных растениях: атлас-справочник / под ред. С. Ю. Раделова - СПб: ООО «СЗКЗ», 2008. – 8 с.
3. О. Н. Дюжиковых. Лекарственное значение тмина обыкновенного (salut satvi) в медицине. «Мировая наука» №4 (49), 2021. – 107-108 с.
4. У. А. Ахатаева, Р. А. Омарова. Спектрофотометрическое определение биологически активных веществ в слоевище исландского мха. Вестник КазНМУ №4-2018. — 146 с.
5. Фармагнозия. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения: учебное пособие / под ред. Г. П. Яковлева. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб: СпецЛит. 2010. – 355 с.
6. Н. В. Соколова. Полезные свойства и применение шалфея лекарственного.
7. Тысячелистник обыкновенный в народной и научной фитотерапии. / под ред. Кароматова И. Д. Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №1 – январь (18) 2018. — 168-175 с.
8. Интернет-ресурс kiberis.ru
9. А. С. Чубарова. Фармагнозия и ботаника. Вестник фармации №4 (58) 2012. — 28-29 с.
10. Л. А. Король, С. А. Скатков. Эффективная фитотерапия функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта. ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова», кафедра фармацевтической технологии, г. Москва.
11. А. В. Корочинский. Актуальные аспекты медицинского применения ореха черного – Juglans nigra L. (обзор).
12. Г. А. Гарбузов. Черный орех и другие орехи-целители — Издательство: Питер, 2005 г.
13. В.Л. Васюк. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування галенових препаратів дев'ясила високого зворотно на хронічний гастродуоденіт, поєднаний із хронічним некаменним холециститом: автореф. дис. канд. мед. наук: 14. 02. 02 - внутрішні хвороби/В.Л. Васюк. - Івано-Франківськ, 2002. - 23 с.



Инструкция по применению фитокомплекса

9-ка ГАСТРО с алтеем

НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЖКТ



СОСТАВ		15 мл (18 г)
Активные компоненты		
Полиэктракт (1:1)		9000 мг
Массовая доля компонентов полиэкстракта:		
Алтея лекарственного корня		1220 мг
Тмина обыкновенного плоды		1100 мг
Цетрарии исландской слоевища		1100 мг
Мята перечной листья		1000 мг
Шалфея лекарственного листья		1000 мг
Тысячелистника обыкновенного трава		1000 мг
Расторопши пятнистой плоды		1000 мг
Ореха черного листья		1000 мг
Девясила высокого корневища с корнями		580 мг

Биологически активные вещества, поступающие в организм, не менее		
Показатель	Содержание в 10 мл (12 г) - 15 мл (18 г), мг	% от адекватного уровня потребления в сутки
Флавоноиды в пересчете на рутин	16,8-25,2	56-84
Дубильные вещества в пересчете на танин	60-90	20-30
Флавоноглюкозиды в пересчете на силибин	37,2-55,8	124*-186*

* - не превышает верхний допустимый уровень потребления.

Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.

ОПИСАНИЕ
Густоватая жидкость от коричневого до красновато-коричневого цвета с характерным запахом и горьковатым послевкусием.
Допустимо наличие опалесценции, помутнение или выпадение осадка, что не влияет на качество и действие данного фитокомплекса.
Допускаются различия в партиях по органолептическим показателям (вкус, цвет, запах), что связано с исключительными природными особенностями растительного сырья (время сбора, климатические условия года, регион произрастания и др.). Подобные различия являются подтверждением натуральности растительного сырья и не влияют на эффективность фитокомплексов.

СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ

- Обладают обволакивающим, болеутоляющим, гастропротекторным, репаративным, противовоспалительным свойствами;
- Оказывают бактериостатические действие на *Helicobacter pylori*;
- Способствуют выработке защитной слизи;
- Защищают от повреждающего воздействия различных лекарств, раздражающих слизистую желудка;
- Оказывают желчегонное действие, положительно влияя на микрофлору кишечника, улучшают детоксикационную функцию печени;
- Обладают противовоспалительным, ветрогонным, спазмолитическим действием;
- Уменьшают процессы гниения и брожения в желудке;
- Умеренно снижают кислотность желудка;
- Снижают риск развития язвы и гастрита;
- Устраняют дискомфорт в желудке и улучшают пищеварение;
- Способствуют нормализации функциональной активности желудочно-кишечного тракта;

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Взрослым по 5 мл (1 ч. л.) 3 раза в день за
20-30 минут до еды. Дозирование препарата

проводить мерным стаканчиком, либо мерной ложкой (в соответствии с комплектацией).
Можно разбавить или запить водой.
Продолжительность приёма — 1 месяц.
При необходимости приём можно повторить.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью, склонность к диарее. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не содержит сахарозы, алкоголя, красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок. Не влияет на способность управлять автомобилем и работать со сложными техническими устройствами. В первые дни приема возможен легкий и непродолжительный слабительный эффект, обусловленный действием сорбита.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Поскольку 9-ка ГАСТРО с алтеем не содержит сахара, ее можно принимать при сахарном диабете. 3 чайные ложки (15 мл) содержат не более 0,23 г сорбитола, что соответствует не более 0,1 ХЕ. 1 ХЕ соответствует количеству продуктов питания, в котором содержится 10-12 г углеводов.

ФОРМА ВЫПУСКА

Раствор для приема внутрь.
Во флаконах по 250 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

**РЕКОМЕНДУЕМ
В КОМПЛЕКСЕ**

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
«ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖТ»**

Наименование	Активные компоненты	Свойства компонентов	Способ применения	Курс приема
Хитозан Адаванс	Смесь хитозанов с различной молекулярной массой.	Одно из основных свойств хитозана — регенерация, заживление слизистых. Хитозан пользуется особой популярностью при лечении болезней ЖКТ. Он обладает гепатопротекторным действием, нейтрализует избыточное выделение соляной кислоты желудком, положительно влияет на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Его прием допускается и на голодный желудок, и при гастрите, и при язвенных заболеваниях.	По 15 мл 2 раза в день за 30-40 минут до еды. 7 дней.	
9-ка ГАСТРО с алтеем	Алтей лекарственный, тмин обыкновенный, цетрария исландская, мята перечная, шафрей лекарственный, тысячелистник обыкновенный, расторопша пятнистая, орех черный, девясил высокий.	Полиэкстракт 9-ти растений. Компоненты оказывают обволакивающее, гастропротекторное, противовоспалительное действие, тем самым снижая агрессивное воздействие на слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки (соляная кислота, ферменты и др.), а также препятствуют всасыванию ядов и токсинов.	По 5 мл 2-3 раза в день во время еды.	
9-ка ГАСТРО с солодкой	Солодка голая, аир болотный, зверобой продырявленный, календула лекарственная, меллисса лекарственная, ромашка аптечная, сушеная топанная, фенхель обыкновенный, синюха голубая.	Полиэкстракт 9-ти растений. Компоненты оказывают гастропротекторное, репаративное, противовоспалительное, обладают противовоспалительным, спазмолитическим действием. Стимулируют выработку желудочного сока, если она замедлена или нарушена. Умеренно снижают кислотность желудка. Снижают риск развития язвы и гастрита. Устраняют дискомфорт в желудке и улучшают пищеварение. Способствуют нормализации функциональной активности желудочно-кишечного тракта.	По 5 мл 3 раза в день через 1-1,5 часа после еды.	
Куркумин Адаванс	Куркума длинная (в том числе куркумин), перец черный (в том числе пиперин), лецитин подсолнечный.	Куркумин увеличивает выработку пищеварительных соков, ускоряет метаболизм, за счет чего улучшается работа ЖКТ, пища лучше усваивается. Оказывает антибактериальное, ветрогонное, заживляющее действие. Рекомендуется как средство, стимулирующее секрецию желудка, нормализующее работу кишечника.	По 7,5 мл 1 раз в день во время еды, 14 дней.	
ПЕРЕРЫВ 15 ДНЕЙ				
ЮГЛОН	Орех черный.	Нормализация функционирования ЖКТ, снижение риска рецидивов хронических заболеваний желудка (в том числе хронический гастрит с пониженной секреторной функцией) и двенадцатиперстной кишки, дисбактериоз кишечника. Противовоспалительное действие, детоксикационный эффект.	По 10 мл 2-3 раза в день за 20-30 минут до еды.	
ЦЕТРАМАКС	Цетрария исландская (исландский мох).	Гепатопротекторное действие, противовоспалительная активность. Действие слизи на слизистую пищеварительного тракта при желудочно-кишечных заболеваниях способствует стабилизации выделительной функции желез желудка при гиперацидном гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.	По 10 мл 3 раза в день, непосредственно после еды.	